

## 2. Funções e Gráficos



### 2.1 Domínio e Imagem

**2.1A** Dê o domínio e esboce o gráfico de cada uma das funções abaixo.

(a)  $f(x) = 3x$

(b)  $g(x) = -x$

(c)  $h(x) = -x + 1$

(d)  $f(x) = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$

(e)  $g(x) = \frac{1}{2}x$

(f)  $g(x) = |x - 1|$

(g)  $h(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \leq 2 \\ 3, & \text{se } x > 2 \end{cases}$

(h)  $h(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } x \leq -1 \\ -x + 1, & \text{se } x > -1 \end{cases}$

(i)  $h(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1}$

(j)  $f(x) = |x + 2| + 1$

(k)  $h(x) = \frac{|2x + 1|}{2x + 1}$

(l)  $h(x) = |x + 2|$

(m)  $f(x) = \frac{|x|}{x}$

(n)  $g(x) = \frac{|x - 1|}{x - 1}$

(o)  $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

**2.1B** Considere a função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $f(x) = |x - 1| + |x - 2|$ . Mostre que:

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 3, & \text{se } x \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < x < 2 \\ 2x - 3, & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

e esboce o gráfico de  $f$ .

**2.1C** Determine o domínio das funções indicadas abaixo.

(a)  $f(x) = \frac{1}{x - 1}$

(b)  $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

(c)  $s(t) = \sqrt{t^2 - 1}$

(d)  $y = \frac{x}{x + 2}$

(e)  $h(x) = \sqrt{x + 2}$

(f)  $q(x) = \frac{x + 1}{x^2 + x}$

(g)  $r(x) = \sqrt{\frac{x - 1}{x + 1}}$

(h)  $y = \sqrt[4]{\frac{x}{x + 3}}$

(i)  $g(x) = \sqrt[3]{x^2 - x}$

(j)  $y = \sqrt{x(2 - 3x)}$

(k)  $f(x) = \sqrt{\frac{2x - 1}{1 - 3x}}$

(l)  $y = \sqrt[6]{\frac{x - 3}{x + 2}}$

(m)  $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

(n)  $y = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x - 1}}$

(o)  $y = \sqrt{4 - x^2}$

(p)  $y = \sqrt{5 - 2x^2}$

(q)  $y = \sqrt{x - 1} + \sqrt{3 - x}$

(r)  $y = \sqrt{1 - \sqrt{x}}$

(s)  $y = \sqrt{x} - \sqrt{5 - 2x}$

(t)  $y = \sqrt{x - \sqrt{x}}$

**2.1D** Utilizando o procedimento indicado no Exercício 2.2, esboce o gráfico das funções definidas abaixo.

$$(a) f(x) = |x| - 1 \quad (b) g(x) = ||x| - 1| \quad (c) h(x) = |x + 1| - |x| \quad (d) y = |x^2 - 1|$$

**2.1E** Uma pequena indústria fabrica termômetros e estima que o lucro semanal, em reais, pela fabricação e venda de  $x$  unidades/semana é de  $R(x) = -0,001x^2 + 8x - 5000$ . Qual o lucro da empresa em uma semana que foram fabricados 1.000 termômetros?

**2.1F** Determine o domínio da função  $f(x) = \sqrt{4 - \left| \frac{3 - 2x}{2 + x} \right|}$ .

**2.1G** Considere a função  $f$  definida em  $[-3, 2]$  por  $f(x) = |x^3 - 2x^2 + 3x - 4|$ . Determine dois números reais  $m$  e  $M$  tais que  $m \leq f(x) \leq M$ , seja qual for o valor de  $x$  no intervalo  $[-3, 2]$ .

**2.1H** Considere a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = x^2 + 4x + 5$ .

(a) Verifique que  $f(x) = (x + 2)^2 + 1$ ;

(b) Esboce o gráfico de  $f$ ;

(c) Calcule o menor valor de  $f(x)$  e para qual  $x$  esse valor é assumido.

**2.1I** Verifique que  $\sqrt{1 + x^2} - |x| = \frac{1}{|x| + \sqrt{1 + x^2}}$  e, então, conclua que a medida que  $x$  cresce, o valor da diferença  $\sqrt{1 + x^2} - |x|$  aproxima-se de zero.

**2.1J** Seja  $y = f(x)$  a função dada a partir da equação  $x^2 + y^2 = 4$ , para  $y \geq 0$ .

(a) Determine uma fórmula que defina explicitamente  $y$  como função de  $x$ ;

(b) Determine o domínio de  $f$ ;


(c) Esboce o gráfico de  $f$ .

**2.1K** Uma caixa retangular sem tampa, com volume de  $2m^3$ , tem uma base quadrada. Expresse a área  $S$  da superfície da caixa como uma função do comprimento  $x$  de um lado da base.

**2.1L** À medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e esfria. Sabendo-se que a temperatura do solo é de  $20^{\circ}C$  e que a temperatura a  $1km$  de altura é de  $10^{\circ}C$ , expresse a temperatura  $T$ , em  $^{\circ}C$ , como uma variável dependente da altura  $h$ , medida em  $km$ , supondo que um modelo baseado em uma função *afim* seja apropriado. Qual a temperatura a uma altura de  $2,5km$ ?


**2.1M** Suponha que a figura abaixo representa graficamente uma função  $y = f(x)$ .

- (a) Determine  $f(-1)$ .
- (b) É correta a estimativa  $2 < f(2) < 3$ ?
- (c) Para quais valores de  $x$  tem-se  $f(x) = 2$ ?
- (d) Para quantos valores de  $x$  tem-se  $f(x) = 0$ ?
- (e) Qual o domínio de  $f$ ?
- (f) Qual a imagem de  $f$ ?



**2.1N** Considere as funções  $f$  e  $g$ , cujos gráficos são representados na figura abaixo.

- (a) Obtenha os valores de  $f(-4)$  e  $g(3)$ .
- (b) Para quais valores de  $x$ ,  $f(x) = g(x)$ ?
- (c) Estabeleça o domínio e a imagem de  $f$ .
- (d) Estabeleça o domínio e a imagem de  $g$ .
- (e) Para quantos valores de  $x$ ,  $f(x) = 0$ ?
- (f) Para quantos valores de  $x$ ,  $g(x) = 0$ ?



- Se uma função  $f$  satisfaz  $f(x) = f(-x)$ , para todo  $x$  em seu domínio, então  $f$  é denominada *função par*. Se  $f$  satisfaz  $f(x) = -f(-x)$ , para todo  $x$  em seu domínio, então  $f$  é denominada uma *função ímpar*.

**2.1O** Com base na definição acima, classifique cada uma das funções abaixo.

(a)  $f(x) = x^3$    (b)  $g(x) = x^2$    (c)  $h(x) = 2x - x^2$    (d)  $k(x) = 1 - x^4$    (e)  $f(x) = |x|$ .

**2.1P** Dada uma função  $f$ , definida em  $\mathbb{R}$  ou em um intervalo  $(-a, a)$ , mostre que  $g(x) = f(x) + f(-x)$  é uma função par e que  $h(x) = f(x) - f(-x)$  é uma função ímpar. Deduza a partir daí que qualquer função  $f$ , definida em um intervalo  $(-a, a)$ , pode ser expressa como soma de uma função par com uma função ímpar.

- As funções  $f : A \rightarrow B$  e  $g : A' \rightarrow B'$  são iguais quando  $A = A'$ ,  $B = B'$  e  $f(x) = g(x)$ ,  $\forall x \in A$ .

**2.1Q** Diga se  $f$  e  $g$  são iguais em cada um dos casos abaixo.

$$(a) f(x) = \sqrt{x}\sqrt{x-1} \text{ e } g(x) = \sqrt{x^2-x} \quad (b) f(x) = x^2 \text{ e } g(x) = |x|^2$$

$$(c) f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} \text{ e } g(x) = x+1 \quad (d) f(x) = x \text{ e } g(x) = \sqrt{x^2}$$

**2.1R** Determine a função quadrática  $f$  que satisfaz  $f(0) = 5$ ,  $f(-1) = 10$  e  $f(1) = 6$ .

- Uma função  $f$  é dita *crecente* em um intervalo  $I$ , se dados  $x_1, x_2 \in I$ , com  $x_1 < x_2$ , tem-se  $f(x_1) < f(x_2)$ . Se  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , para  $x_1 < x_2$ , então  $f$  é dita não-decrescente em  $I$ .
- Uma função  $f$  é dita *decrescente* em um intervalo  $I$ , se dados  $x_1, x_2 \in I$ , com  $x_1 < x_2$ , tem-se  $f(x_1) > f(x_2)$ . Se  $f(x_1) \geq f(x_2)$ , para  $x_1 < x_2$ , então  $f$  é dita não-crescente em  $I$ .

**2.1S** Mostre que a função afim  $f(x) = ax + b$  é crescente, se  $a > 0$ , e decrescente, se  $a < 0$ .

**2.1T** Com relação ao gráfico apresentado no Exercício 2.13, identifique o conjunto no qual  $f$  é uma função crescente.

- Considere duas funções  $f$  e  $g$  tais que a imagem de  $f$  seja um subconjunto do domínio de  $g$ , isto é,  $\text{Im}(f) \subset D(g)$ . Denominamos de *composta* de  $g$  e  $f$ , e anotamos  $g \circ f$ , a função com domínio  $D(f)$  e definida por:  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ , com  $x \in D(f)$ .

**2.1U** Nos casos a seguir, verifique que  $\text{Im}(f) \subset D(g)$  para, assim, determinar a função composta  $h = g \circ f$ .

$$(a) f(x) = x^2 \text{ e } g(x) = \sqrt{x} \quad (b) f(x) = x^2 + 3 \text{ e } g(x) = \frac{x+1}{x-2}$$

$$(c) f(x) = -\sqrt{x} \text{ e } g(x) = \sqrt{2-x} \quad (d) f(x) = \frac{x}{x+1} \text{ e } g(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

**2.1V** Determine a função  $f$  de modo que  $(g \circ f)(x) = x, \forall x \in D(f)$ , onde:

$$(a) g(x) = \frac{x+2}{x+1} \quad (b) g(x) = x^2 - 2x, \text{ definida para } x \geq 1.$$

**2.1W** Considere  $f$  uma função par e seja  $h = g \circ f$ . Mostre que  $h$  é uma função par. E se  $f$  for uma função ímpar, pode-se afirmar que  $h$  também o será?

## 2.2 Invertendo uma função real

- Diz-se que uma função  $f$  é *injetora* (ou *injetiva*) se dado  $y \in \text{Im}(f)$ , existe um único  $x \in D(f)$  tal que  $y = f(x)$ . Isto é equivalente a:  $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$ .
- Diz-se que  $f : D(f) \rightarrow B$  é *sobrejetora* (ou *sobrejetiva*) se  $\text{Im}(f) = B$ , isto é, dado  $y \in B$ , existe  $x \in D(f)$  tal que  $y = f(x)$ .
- Diz-se que uma função  $f$  é *bijetora* (ou *bijetiva*) quando for, simultaneamente, injetora e sobrejetora. Neste caso, temos:

$$\begin{aligned} f : D(f) &\longrightarrow \text{Im}(f) \\ x &\longmapsto f(x) = y \end{aligned}$$

e podemos definir a função  $g$ , *inversa* de  $f$ , do modo seguinte:

$$\begin{aligned} g : \text{Im}(f) &\longrightarrow D(f) \\ y = f(x) &\longmapsto g(y) = x. \end{aligned}$$

A função  $f^{-1}$  inversa de  $f$  é caracterizada por:  $(f \circ f^{-1})(y) = y$  e  $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ .

**2.2A** Verifique que a função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = 3x + 5$  é bijetora e determine sua inversa.

**2.2B** Considere a função do exercício precedente e determine a inversa da função  $f \circ f^{-1}$ .

**2.2C** Dê domínio e contra-domínio adequados à função  $f(x) = x^2$ , de modo que a mesma seja invertível e determine a sua inversa.

**2.2D** Considere a função  $f(x) = k/x$ , onde  $k$  é uma constante. É necessário impor alguma restrição à constante  $k$  para que  $f$  seja invertível? Quem é  $f^{-1}$ ?

**2.2E** Considere  $f : [1/2, +\infty) \rightarrow [b, +\infty)$  definida por  $f(x) = x^2 - x + 1$ . Qual o valor de  $b$  que torna  $f$  invertível? Quem é  $f^{-1}$ ? Esboce o gráfico de  $f^{-1}$ .

## Respostas e Sugestões

**2.1A** As funções apresentadas em (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (j) e (l) têm para domínio o conjunto  $\mathbb{R}$  dos números reais. Por outro lado, temos: (i)  $\mathbb{R} - \{1\}$  e  $h(x) = x + 1$ , se  $x \neq 1$   
 k)  $\mathbb{R} - \{-1/2\}$  (m)  $\mathbb{R} - \{0\}$  (n)  $\mathbb{R} - \{1\}$  (o)  $\mathbb{R} - \{-1\}$  e  $g(x) = x - 1$ , se  $x \neq -1$  **2.1C**  
 (a)  $\mathbb{R} - \{1\}$  (b)  $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$  (c)  $(-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$  (d)  $\mathbb{R} - \{-2\}$  (e)  $[-2, +\infty)$  (f)  $\mathbb{R} - \{-1, 0\}$   
 (g)  $(-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$  (h)  $(-\infty, -3) \cup [0, +\infty)$  (i)  $\mathbb{R}$  (j)  $[0, 2/3]$  (k)  $(1/3, 1/2]$  (l)  $(-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$  (m)  $\mathbb{R}$  (n)  $[0, +\infty) - \{1\}$  (o)  $[-2, 2]$  (p)  $[-\sqrt{5/2}, \sqrt{5/2}]$  (q)  $[1, 3]$  (r)  $[0, 1]$  (s)  
 $[0, 5/2]$  (t)  $[1, +\infty) \cup \{0\}$  **2.5** R\$2.000,00 **2.6**  $D(f) = \mathbb{R} - (-11/2, -5/6)$  **2.1G**  
 $M = 58$  e  $m = 0$  **2.1H** (c) 1;  $x = -2$  **2.1J** (a)  $y = \sqrt{4 - x^2}$  (b)  $[-2, 2]$  **2.1K**  
 $S(x) = x^2 + 8/x$  **2.1L**  $T(h) = -10h + 20$ ;  $T(2, 5) = -5^0 C$  **2.1M** (a)  $-4$  (b)  $\text{sim}$  (c)  
 $x = -3$ ,  $x = 1$  (d) para dois valores (e)  $[-3, 3]$  (f)  $[-4, 4]$  **2.1N** (a)  $f(-4) = -2$ ;  $g(3) = 3$   
 (b)  $x = -2$ ,  $x = 2$  (c)  $D(f) = [-4, 4]$ ;  $\text{Im}(f) = [-2, 3]$  (d)  $D(g) = [-4, 3]$ ;  $\text{Im}(g) = [1/2, 3]$   
 (e) para dois valores (f) nenhum **2.1O** (a) ímpar (b) par (c) nem par nem ímpar (d) par  
 (e) par **2.1P** As funções  $f$  e  $g$  são iguais apenas no caso (b) **2.1Q**  $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$   
**2.1S** A função  $f$  é crescente no intervalo  $[0, 3]$  **2.21** (a)  $\text{Im}(f) = D(g) = [0, +\infty)$  e  
 $h(x) = |x|$  (b)  $\text{Im}(f) = [3, +\infty) \subset D(g) = \mathbb{R} - \{2\}$  e  $h(x) = \frac{x^2 + 4}{x^2 + 1}$  (c)  $\text{Im}(f) = (-\infty, 0) \subset$   
 $D(g) = (-\infty, 2]$  e  $h(x) = \sqrt{2 + \sqrt{x}}$ ,  $x > 0$  (d)  $\text{Im}(f) = D(g) = \mathbb{R} - \{1\}$  e  $h(x) = -2x - 1$ ,  $x \neq$   
 $-1$  **2.1T** (a)  $f(x) = \frac{x - 2}{1 - x}$  (b)  $f(x) = 1 + \sqrt{1 + x}$  **2.1U** Podemos concluir que  $h$  é uma  
 função ímpar, se  $f$  e  $g$  o forem **2.2A**  $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}(x - 5)$  **2.2B**  $f \circ f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , dada  
 por  $(f \circ f^{-1})(x) = x$  **2.2C**  $D(f) = CD(f) = [0, +\infty)$  e  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  **2.2D**  $k \neq 0$   
 e  $f^{-1} = f$  **2.2E**  $b = 3/4$ . A inversa é a função  $g : [3/4, +\infty) \rightarrow [1/2, +\infty)$ , definida por  
 $g(y) = \frac{1}{2} + \sqrt{y - \frac{3}{4}}$