


## 3. Limite e Continuidade



### 3.1 Cálculo de Limites

**3.1A** Em cada caso abaixo calcule o limite de  $f(x)$ , quando  $x \rightarrow a$ .

(a)  $f(x) = 2x + 5$ ;  $a = -7$       (b)  $f(x) = \frac{3}{\sqrt{3x+1}+1}$ ;  $a = 0$   
(c)  $f(x) = \frac{x^2+3x-10}{x+5}$ ;  $a = -5$       (d)  $f(x) = \frac{-2x-4}{x^3+2x^2}$ ;  $a = -2$   
(e)  $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$ ;  $a = 1$       (f)  $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$ ;  $a = -1$   
(g)  $f(x) = \frac{x^4-1}{x^3-1}$ ;  $a = 1$       (h)  $f(x) = \frac{3-\sqrt{x}}{9-x}$ ;  $a = 9$   
(i)  $f(x) = \frac{x^2+x}{x}$ ;  $a = 0$       (j)  $f(x) = \frac{x^2+8x-20}{x^2-x-2}$ ;  $a = 2$   
(k)  $f(x) = \frac{1-\sqrt{1+x}}{\sqrt{x-1}-x}$ ;  $a = 3$       (l)  $f(x) = \frac{x^4-2x+1}{x^3+2x^2+1}$ ;  $a = 1$   
(m)  $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2}}{x-2}$ ;  $a = 2$       (n)  $f(x) = \frac{(3-x^3)^4-16}{x^3-1}$ ;  $a = 1$  (faça  $u = 3-x^3$ )  
(o)  $f(x) = \sqrt{\frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x^2-1}}$ ;  $a = 1$       (p)  $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x+2}-1}{x+1}$ ;  $a = -1$  (faça  $u = \sqrt[3]{x+2}$ )

**3.1B** Se  $f$  é uma função definida em  $\mathbb{R}$  e  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ , mostre que:

(a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = 3$       (b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x} = 0$

**3.1C** Se  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ , calcule  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$ .

**3.1D** Sabendo-se que  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ , calcule  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

**3.1E** Se  $\varphi$  é uma função tal que  $1 - \frac{x^2}{4} \leq \varphi(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ ,  $\forall x \neq 0$ , calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x)$ .

**3.1F** Sejam  $f$  e  $g$  funções definidas em  $D$ , tais que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  e  $|g(x)| \leq M$ ,  $\forall x \in D$ , sendo  $M$  uma constante positiva. Use o Teorema do Sanduíche e mostre que  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = 0$ .

**3.1G** Considere a função  $g$  definida por  $g(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \leq 0 \\ -1, & \text{se } x > 0 \end{cases}$ . Investigue a existência dos limites:  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  e  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 g(x)$ .

**3.1H** Em cada caso abaixo, calcule os limites laterais de  $f$  no ponto  $a$ .

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} f(x) = \frac{x+3}{x+2}, a = -2 & \text{(b)} f(x) = \frac{x}{(x-2)^2}, a = 2 \\ \text{(c)} f(x) = \frac{2-x}{(1-x)^3}, a = 1 & \text{(d)} f(x) = \frac{x^2-4}{|x-2|}, a = 2 \\ \text{(e)} f(x) = \frac{\sqrt{x^2+4x+5} - \sqrt{5}}{x}, a = 0 & \text{(f)} f(x) = \frac{(x+3)|x+2|}{x+2}, a = -2 \\ \text{(g)} f(x) = \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}, a = 1 & \text{(h)} f(x) = \frac{x+3}{|x^2-9|}, a = -3 \\ \text{(i)} f(x) = \frac{x^2-1}{|x-1|}, a = 1 & \text{(j)} f(x) = \frac{x+2}{|x^2-4|}, a = -2 \end{array}$$

**3.1I** Calcule  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{x-2}$  e verifique se existe o limite  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{x-2}$ .

**3.1J** Calcule os limites laterais indicados.

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} & \text{(b)} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} & \text{(c)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} & \text{(d)} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} \\ \text{(e)} \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{5}{x-3} & \text{(f)} \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{5}{x-3} & \text{(g)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x+1}{x} & \text{(h)} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-3}{x^2} \\ \text{(i)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x^2-x} & \text{(j)} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x^2-x} & \text{(k)} \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2-3x}{x^2-6x+9} & \text{(l)} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{|x-1|}{x-1} \\ \text{(m)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x+1}{x^2+x} & \text{(n)} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3x^2-4}{1-x^2} & \text{(o)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} & \text{(p)} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2+3}{x^2-1} \end{array}$$

**3.1K** Calcule os seguintes limites no infinito.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 + 3x + 2) & \text{(b)} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 - 3x + 2) & \text{(c)} \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 + 2x + 1) \\ \text{(d)} \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 + 2x + 1) & \text{(e)} \lim_{x \rightarrow +\infty} (5 - 4x + x^2 - x^5) & \text{(f)} \lim_{x \rightarrow -\infty} (5 - 4x + x^2 - x^5) \\ \text{(g)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 6x + 1}{6x^3 + 2} & \text{(h)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 - 6x + 1}{6x^3 + 2} & \text{(i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + 1}{x + 3} \\ \text{(j)} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x+3}) & \text{(k)} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2+3}) & \text{(l)} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^3+3}) \\ \text{(m)} \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{x^3+3}) & \text{(n)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5-x}{3+2x} & \text{(o)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-\sqrt{|x|}}{\sqrt{1-x}} \end{array}$$

**3.1L** Calcule  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ , onde a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é definida por  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & \text{se } x \neq 1 \\ 3, & \text{se } x = 1 \end{cases}$ .

Esta função é contínua em  $x = 1$ ?

**3.1M** Seja  $f$  uma função real contínua, definida em torno do ponto  $a = 1$ , tal que  $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$ , para  $x \neq 1$ . Quanto vale  $f(1)$ ? Por quê?

**3.1N** Determine o valor de  $k$ , de modo que cada uma das funções dadas abaixo seja contínua no ponto  $a$  indicado.

$$(a) a = 2; f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & \text{se } x \neq 2 \\ k, & \text{se } x = 2 \end{cases} \quad (b) a = 3; f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3}, & \text{se } x > 0 \text{ e } \neq 3 \\ k, & \text{se } x = 3 \end{cases}$$

**3.1O** Seja  $f$  a função definida por:  $f(-1) = 2$  e  $f(x) = \frac{x^2 + x}{x + 1}$ , para  $x \neq -1$ . A função  $f$  é contínua no ponto  $x = -1$ ? Por quê? E no ponto  $x = 0$ ?

**3.1P** Dê exemplo de uma função  $f$ , definida em  $\mathbb{R}$ , descontínua no ponto  $x = 2$ , mas que satisfaça  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ .

## 3.2 Continuidade

**3.2A** Qual das afirmações abaixo é verdadeira?

(a)  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \implies f$  é contínua em  $x = a$ ;

(b) Se  $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)|$  existe, então  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  também existe;

(c) Se  $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$ , então  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ .

**3.2B** Seja  $f$  uma função tal que  $|f(x)| \leq x^2$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Mostre que  $f$  é contínua em  $x = 0$ .

**3.2C** Esboce o gráfico e encontre os pontos de descontinuidade da função  $f$ , definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + 3}{5}, & \text{se } x \leq 1 \\ 6 - 5x, & \text{se } 1 < x < 3 \\ x - 3, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

**3.2D** Em cada caso, esboce o gráfico da função e diga se ela é contínua no ponto  $a$  indicado.


$$(a) a = 0; f(x) = \begin{cases} 2 - x, & \text{se } x > 1 \\ x^2, & \text{se } x \leq 1 \end{cases} \quad (b) a = 0; f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{|x-2|}, & \text{se } x \neq 2 \\ 1, & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

$$(c) a = -1; f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} \quad (d) a = 1; f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ [x], & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

Nota: No Exercício 3.20(d),  $[x]$  representa o *maior inteiro menor ou igual a  $x$*  e a função correspondente  $x \mapsto [x]$  é denominada *função escada*.

**3.2E** Seja  $f$  a função cujo gráfico encontra-se esboçado abaixo.

- Calcule  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ .
- Calcule  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ .
- Calcule  $f(0)$ .
- Calcule  $f(3)$ .
- $f$  é contínua no ponto  $x = 0$ ?
- $f$  é contínua no ponto  $x = 3$ ?



**3.2F** Existe um número real  $\alpha$  capaz de fazer com que  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + \alpha x + \alpha + 3}{x^2 + x - 2}$  exista?

**3.2G** Uma companhia ferroviária cobra R\$10,00 por  $km$ , para transportar um vagão até uma distância de  $200km$ , cobrando ainda R\$8,00 por cada  $km$  que exceda a 200. Além disso, essa mesma companhia cobra uma taxa de serviço de R\$1.000,00 por vagão, independentemente da distância a percorrer.

Determine a função que representa o custo para transportar um vagão a uma distância de  $x km$  e esboce seu gráfico. Essa função é contínua em  $x = 200$ ?

**3.2H** Uma fábrica é capaz de produzir 15.000 unidades de um certo produto, em um turno de 8 horas de trabalho. Para cada turno de trabalho, sabe-se que existe um custo fixo de R\$2.000,00, relativo ao consumo de energia elétrica. Supondo-se que, por unidade produzida, o custo variável, dado o gasto com matéria prima e salários, é de R\$2,00, determine a função que representa o custo

total para a fabricação de  $x$  unidades e esboce seu gráfico. A função encontrada é contínua para  $0 \leq x \leq 45.000$ ?

**3.2I** Um estacionamento cobra R\$3,00 pela primeira hora, ou parte dela, e R\$2,00 por hora sucessiva, ou parte dela, até o máximo de R\$10,00. Esboce o gráfico do custo do estacionamento como uma função do tempo decorrido e analise as descontinuidades dessa função.

**3.2J** Prove que a equação  $x^5 + x + 1 = 0$  tem pelo menos uma raiz no intervalo  $[-1, 0]$ .


**3.2K** Prove que a equação  $x^3 - 4x + 2 = 0$  admite três raízes reais e distintas.

**3.2L** Considere a função  $f$  definida por:  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & \text{se } -2 \leq x \leq 0 \\ -x^2 - 2, & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$ . Mostre que não

existe um número  $\alpha$  no intervalo  $[-2, 2]$  tal que  $f(\alpha) = 0$ . Isto contradiz o corolário do Teorema do valor Intermediário?

**3.2M** Quais das seguintes afirmações sobre a função  $y = f(x)$  ilustrada abaixo são verdadeiras e quais são falsas?

- (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  existe.
- (b)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ .
- (c)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ .
- (d)  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ .
- (e)  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ .
- (f)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe no ponto  $a$  em  $(-1, 1)$ .



**3.2N** Explique por que os limites abaixo não existem.

- (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$
- (b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1}$
- (c)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+3}{(x-1)(x+2)}$
- (d)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+3}{x}$

### Respostas e Sugestões

**3.1A** (a) -9 (b) 3/2 (c) -7 (d) -1/2 (e) 4 (f) -1/3 (g) 4/3 (h) 1/6 (i) 1 (j) 4 (k)  $1/(3 - \sqrt{2})$  (l) 0 (m)  $\frac{1}{3}\sqrt[3]{4}$  (n) -32 (o) 1/2 (p) 1/3 **3.1B** (a) Com  $u = 3x$  tem-se  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = 3 \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u)}{u}$ . Em (b), faça  $u = x^2$  e encontre  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x} = \pm \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sqrt{u}f(u)}{u}$  **3.1C** 4 e -2 **3.1D** 5 **3.1E** 1 **3.1F** Temos:  $0 \leq |f(x) \cdot g(x)| \leq M |f(x)|$  **3.1G**  $g(x)$  não tem limite em  $x = 0$  e  $\lim_{x \rightarrow 0} [x^2 g(x)] = 0$

<b>3.1H</b>		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	-4	$2\sqrt{5}/5$	-1	$-\sqrt{2}$	-1/6	-2	1/4
	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	4	$2\sqrt{5}/5$	1	$\sqrt{2}$	1/6	2	-1/4

**3.1I** Quando  $x \rightarrow 2^+$  o limite existe e vale 0. Quando  $x \rightarrow 2^-$  o limite não existe.

<b>3.1J</b>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
	$\infty$	$-\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$-\infty$	$\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$-\infty$	1	$-\infty$

<b>3.1K1</b>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\infty$	5/6	$\infty$	0	$\infty$	0	$-\infty$	$\infty$	-1/2	-1

**3.1L**  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$  e  $f(1) = 3$ . Logo,  $f$  é descontínua em  $a = 1$  **3.1M** Como  $f$  é contínua em  $a = 1$ , devemos ter  $f(1) = -1$  **3.1N** (a)  $k = 12$  (b)  $k = \sqrt{3}/6$  **3.1O**  $f$  é contínua em  $-1$  e descontínua em 0 **3.1P** Considere, por exemplo, a função  $f$  definida assim:  $f(x) = x$ , para  $x \neq 2$  e  $f(2) = 0$  **3.2A** (a) falsa (b) falsa (c) verdadeira **3.2B** Use o Teorema do Sanduíche **3.2C**  $x = 3$  é a única descontinuidade de  $f$  **3.2D** (a) sim (b) sim (c) não (d) não **3.2E** (a) 3 (b) não existe (c) 3 (d) 4 (e) sim (f) não **3.2F** Se  $\alpha = 15$ , o limite será  $-1$  **3.2G** Se  $x \leq 200$ , o custo  $C(x)$  é determinado em reais por  $C(x) = 1.000 + 10x$ . O custo para uma distância de 200 km é, portanto,  $C(200) = R\$3.000,00$ . Se a distância excede 200 km, isto é, se  $x > 200$ , então o custo total será dado por  $C(x) = 3.000 + 8(x - 200)$ . Resumindo, temos:  $C(x) = 1000 + 10x$ , se  $0 < x \leq 200$ , e  $C(x) = 1400 + 8x$ , para  $x > 200$ . Essa função é contínua em  $x = 200$  **3.2H** Se  $0 \leq x \leq 15000$ , um único turno de trabalho será suficiente e, assim,  $C(x) = 2000 + 2x$ . Se  $15000 < x \leq 45000$ , então a fábrica deverá operar em 3 turnos e, nesse caso,  $C(x) = 6000 + 10x$ . Nesse intervalo a função custo é descontínua **3.2I** As descontinuidades ocorrem nos pontos  $t = 1$ ,  $t = 2$ ,  $t = 3$  e  $t = 4$  **3.2L** Não. Como a função

não é contínua em  $[-2, 2]$ , o fato não contradiz o resultado citado **3.2M** V, V, F, F, F, V

**3.2N** Em cada caso note que os limites laterais, quando existem, são diferentes.